



SIGNES D'ALERTE

Il est important de surveiller régulièrement tous vos symptômes. Ce document vous donne une liste succincte des symptômes à surveiller et vous explique ce que vous devez faire s'ils surviennent.

DEMANDEZ IMMEDIATEMENT DE L'AIDE SI VOUS EPROUVEZ L'UN DES SYMPTOMES SUIVANTS :
--

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Douleur persistante à la poitrine qui n'est pas soulagée par la Trinitrine• Essoufflement sévère et persistant• Evanouissement |
|--|

INFORMEZ VOTRE MEDECIN OU VOTRE INFIRMIERE DES QUE POSSIBLE SI VOUS EPROUVEZ L'UN DES SYMPTOMES SUIVANTS:
--

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Augmentation de l'essoufflement et baisse de votre tolérance à l'effort• Souffle court à chaque réveil• Besoin de plus d'oreillers pour dormir confortablement• Fréquence cardiaque rapide ou aggravation des palpitations |
|---|

PARLEZ A VOTRE MEDECIN OU VOTRE INFIRMIERE EN CAS DE:
--

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Prise de poids rapide: plus de 2 kilos en trois jours• Gonflement progressif ou douleur dans l'abdomen• Augmentation du gonflement des jambes ou des chevilles• Aggravation des vertiges• Perte d'appétit/nausée• Augmentation de la fatigue• Aggravation de la toux |
|--|

Important: Si vous avez d'autres symptômes qui vous inquiètent, vous devriez en discuter avec votre médecin ou votre infirmière.

En cas d'urgence, appeler: (nom de votre médecin ou infirmière)	
N° de Téléphone:	