



SIGNOS DE ALERTA

Es importante que vigile todos sus síntomas de forma regular. Este documento es un recordatorio rápido de los síntomas que debe vigilar y de lo que tiene que hacer si aparecen.

AVISE INMEDIATAMENTE SI PRESENTA UNO DE LOS SIGUIENTES SINTOMAS :
--

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Dolor torácico persistente que no se alivia con nitroglicerina• Disnea intensa y persistente• Desvanecimiento |
|---|

AVISE LO ANTES POSIBLE A SU MÉDICO O ENFERMERA SI PRESENTA UNO DE LOS SIGUIENTES SINTOMAS :
--

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Aumento de la disnea y tolerancia cada vez menor de la actividad• Despertares constantes por disnea• Necesita más almohadas para dormir con comodidad• Frecuencia cardíaca rápida o empeoramiento de las palpitaciones |
|---|

HABLE CON SU MÉDICO O ENFERMERA EN CASO DE :

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Aumento rápido de peso de más de 2 kilos en tres días• Hinchazón o dolor progresivos en el abdomen• Aumento de la hinchazón de las piernas o los tobillos• Empeoramiento de los mareos• Inapetencia / náuseas• Aumento de la fatiga• Empeoramiento de la tos |
|--|

Importante : Si tiene otros síntomas que le preocupan, hable con su médico o enfermera.

En caso de urgencia, llame a : (indique el nombre de su médico o enfermera)	
--	--

Número de teléfono :	
----------------------	--